

알레르기 검사란?

알레르기를 일으키는 원인을 알아내기 위한 피부반응검사 또는 약물을 이용한 기관지 유발검사, 유도객담검사 등을 통해 알레르기 질환을 진단하는 검사입니다.

피부반응 검사

알레르기 원인물질을 찾아내기 위해 시행하며, 알레르기의 유무 및 그 정도를 판단하기 위해 시행합니다.

■ 유의사항

1. 감기약, 한약, 알레르기 비염 약은 검사하기 3일전 부터 중단하여 주십시오. (혈압약, 당뇨약, 영양제 등은 그대로 복용하셔도 됩니다.)
2. 샤워 후 몸에 오일이나 바디로션 등을 바르지 말고 오십시오.
3. 검사 후에는 주사침으로 찌른 부분의 감염 예방을 위해 샤워를 하지 마시고, 검사부위를 긁지 마십시오.

■ 검사종류 및 소요시간

- * 피부단자검사 - 흡입항원
- * 피부단자검사 - 음식물
- * 메타콜린 피부반응검사
- * 자가혈청 피부반응검사
- * 소아피부단자검사
- * 한냉알레르기 검사

 각각 약 30분 정도 소요됩니다.

▶ 검사장소

2층 특수검사부 폐기능 및 알레르기 검사실

기관지유발 검사

1. 기관지 천식을 진단하기 위하여 시행합니다.
2. 기관지를 수축시키거나 기침을 유발할 수 있는 약물을 흡입하게 하여 증상을 유발시킨 후 폐기능을 측정합니다.

■ 유의사항

1. 감기약, 한약, 알레르기 비염약은 검사하기 3일 전부터 중단하여 주십시오. (혈압약, 당뇨약, 영양제 등은 그대로 복용하셔도 됩니다.)
2. 흡입제(벤토린, 아트로벤트 등) 사용은 검사 전 최소 4시간 이상 사용을 중단합니다.

■ 검사종류 및 소요시간

- * 기관지유발시험 (Bronchial Provocation Test)
- 약 40분 소요
- * 기관지유발시험 (비특이적 캡 사이신 사용)
- 약 40분 소요

▶ 검사장소

2층 특수검사부 폐기능 및 알레르기 검사실

유도객담 검사

생리식염수를 흡입하여 객담을 유도함으로써 기관지에서 알레르기성 염증 반응의 지표가 되는 호산구를 측정하는 검사입니다.

■ 유의사항

1. 정확한 검사를 위해서 양치 후에는 아무것도 드시지 마십시오.
2. 흡입제 또는 알레르기 질환과 관련된 약을 드시는 분은 복용중단 여부를 담당의사와 상의 하십시오. (협압약, 당뇨약, 영양제 등은 그대로 복용하셔도 됩니다.)

■ 검사종류 및 소요시간

* 약 30분 정도 소요됩니다.

▶ 검사장소

1층 폐센터 검사실

운동유발 검사

운동을 하면서 유발되는 운동유발성천식 운동유발성 아나필락시스 및 콜린성 두드러기 등을 진단하기 위해서 시행하는 검사 입니다.

■ 검사 전 유의사항

1. 복용중인 약물은 담당의사와 상담 하십시오. (감기약, 한약, 두드러기약, 알레르기비염약, 항히스타민제는 검사 3일전부터 복용 금지)
2. 혈압약, 당뇨약, 영양제등은 그대로 복용하셔도 됩니다.
3. 검사 시작 8시간전에는 벤토린 등 기관지 확장제 사용금지, 4시간 전부터는 격렬한 운동 또는 달리기 금지.
4. 검사 당일은 금식하고 오십시오.(생수는 가능)
5. 음식물 알레르기과 동반된 것으로 의심되는 경우는, 경구 음식물 유발 검사와 운동유발검사가 같이 시행될 수 있으며, 이 경우 소요 시간은 6~10시간 이내로 예상됩니다.
6. 검사 당일 운동 할 수 이는 편한 복장으로 내원 하십시오.(운동화, 운동복등을 준비)
7. 유발 검사에 의한 심한 전신 반응 발생시 경과 관찰, 안정 및 치료를 위해 응급실 방문이 필요 할 수 있으며, 이 경우 응급실 진료에 따른 추가 비용 및 시간이 발생할 수 있습니다.

■ 검사 소요 시간 : 약 2~4시간 이내

▶ 검사 장소

* 1층 폐센터 외래

알레르겐(항원) 유발 검사

특정 알레르겐(항원)에 이상 반응을 보인 환자에게서 원인이 되는 항원을 확인하기 위해 의심되는 항원을 직접 투여해서 동일한 반응이 나타나는지를 확인하는 검사 입니다.

■ 검사 전 유의사항

1. 복용중인 약물은 담당의사와 상담 하십시오. (감기약, 한약, 두드러기약, 알레르기비염약, 항히스타민제는 검사 3일전부터 복용 금지)
2. 혈압약, 당뇨약, 영양제등은 그대로 복용하셔도 됩니다.
3. 검사 시작 8시간전에는 벤토린 등 기관지 확장제 사용금지.
4. 검사 당일은 금식하고 오십시오.(생수는 가능)
5. 유발 검사에 의한 심한 전신 반응 발생시 경과 관찰, 안정 및 치료를 위한 추가적인 시간이 소요 될 수 있습니다.

■ 검사 소요 시간 : 6~8시간 이내

▶ 검사 장소

* 1층 폐센터 외래

경구 음식물 유발검사

음식물에 이상반응을 보인 환자에게서 원인되는 음식물을 찾기 위해 의심되는 음식물을 직접 복용해서 동일한 반응이 나타나는지를 확인하는 검사 입니다.

■ 검사 전 유의사항

1. 복용중인 약물은 담당의사와 상담 하십시오. (감기약, 한약, 두드러기약, 알레르기비염약, 항히스타민제는 검사 3일전부터 복용 금지)
2. 혈압약, 당뇨약, 영양제등은 그대로 복용하셔도 됩니다.
3. 주치의 상담에 의해 필요하다고 판단되는 경우, 해당 음식은 직접 준비하여 가져오실 수 있으며, 그 음식은 검사 1주일 전부터 드시면 안됩니다.
4. 검사 당일은 금식하고 오십시오.(생수는 가능)
5. 검사 시작 8시간 전에는 벤토린 등 기관지 확장제 사용금지.
6. 음식물 알레르기과 동반된 것으로 의심되는 경우는, 경구 음식물 유발검사와 운동유발검사가 같이 시행될 수 있으며, 이 경우 소요 시간은 6~10시간 이내로 예상됩니다.
7. 유발 검사에 의한 심한 전신 반응 발생시, 경과 관찰, 안정 및 치료를 위해 응급실 방문이 필요 할 수 있으며, 이 경우 응급실 진료에 따른 추가 비용 및 시간이 발생할 수 있습니다.

■ 검사 소요 시간 : 6~8시간 이내

▶ 검사 장소

* 1층 폐센터 외래

약물 피부반응 검사

약물 이상 반응을 보인 환자에게서 의심되는 약물로 피부반응 검사를 시행하여 원인되는 약물을 찾고자 시행하는 검사입니다.